

Datum narození	Iniciály	Zařadil
Pohlaví	Centrum	Datum zařazení

ATTRA II – SLE – SLEDAI – 2K

Hodnoťte pouze nálezy přítomné v čase vyšetření, nebo v předchozích 30 dnech.

Váha	Skóre	Deskriptor	Definice
8		Křeče	Nedávno vzniklé. Vyloučit metabolické, infekční a polékové příčiny
8		Psychóza	Porucha schopnosti vykonávat běžné aktivity v důsledku těžké poruchy percepce reality. Patří sem: halucinace, inkoherece, výrazně nesouvislé asociace, oslabený myšlenkový obsah, výrazně nelogické myšlení, bizarní, nekoordinované nebo katatonické chování. Vyloučit podíl přítomnosti urémie a vlivu léků na manifestaci
8		Organický psychosyndrom	Změny duševních funkcí s porušením orientace, paměti nebo jiných intelektuálních schopností, s rychlým vznikem a fluktuujícími klinickými rysy. Neschopnost udržet pozornost k okolí a minimálně 2 z následujících: percepční porucha, nekoherentní řeč, nespavost nebo denní ospalost, zvýšená nebo snížená psychomotorická aktivita. Vyloučit metabolické, infekční a polékové příčiny.
8		Porucha vizu	Změny na sítnici v důsledku postižení SLE: cytoidní tělíska, krvácení do sítnice, serózní exsudáty nebo krvácení v uveji, neuritida optiku. Nikoliv v důsledku hypertenze, léků či infekce.
8		Kraniální neuropatie	Nově vzniklá senzorická či motorická neuropatie hlavových nervů
8		Lupusová cefalea	Těžká, trvalá bolest hlavy, může být i migrenózní, nesmí reagovat na opiatová analgetika.
8		Cévní mozková příhoda	Nově vzniklá mozková příhoda. Vyloučit arteriosklerózu
8		Vaskulitida	Ulcerace, gangrény, citlivé uzlíky na prstech, infarkty kolem nehtů, třískové hemoragie nebo bioptický či angiografický průkaz vaskulitidy
4		Artritida	Nejméně 2 bolestivé klouby s příznaky zánětu (citlivost, otok či výpotek)
4		Myozitida	Bolestivost/slabost proximálního svalstva spojená se zvýšenou hladinou kreatinkinázy nebo aldolázy nebo s EMG nálezem či histologickým průkazem myozitidy
4		Hematurie	Nad 5 erytrocytů v zorném poli. Vyloučit jiné příčiny (litiáza, infekce)
4		Válce	Granulární válce s hemoglobinem, nebo erytrocytární válce
4		Proteinurie	nad 0,5 g/24 h
4		Pyurie	Nad 5 leukocytů v zorném poli. Vyloučit infekci
2		Vyrážka	Zánětlivý typ exantému
2		Alopecie	Abnormální ložisková nebo difuzní ztráta vlasů - nový vznik, nebo rekurence
2		Slizniční vředy	Ústní či nosní ulcerace, nový vznik, nebo rekurence
2		Pleuritida	Pleurální bolest na hrudníku spojená s pleurálním šelestem nebo výpotkem anebo ztlustěním pleury
2		Perikarditida	Perikardiální bolest spojená se šelestem nebo výpotkem, EKG změnami či echokardiografickým potvrzením
2		Snížený komplement	Snížení hladin CH50, C3 nebo C4 (pod limit daný laboratoří)
2		Pozitivní dsDNA	Zvýšená vazba DNA nad normu dané laboratoře
1		Horečka	> 38°C po vyloučení infekce
1		Trombocytopenie	< 100 000/mm ³ . Vyloučit vliv léků
1		Leukopenie	< 3,000/mm ³ . Vyloučit vliv léků

CELKOVÉ SKÓRE:



INSTITUT BIostatistiky A ANALÝZ MU

Kamenice 126/3
625 00 Brno

<http://www.iba.muni.cz>
helpdesk@iba.muni.cz

tel.: +420 549 49 8281, fax: +420 549 49 2855

ČESKÁ REVMA TOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Na Slupi 4
128 50 Praha 2

<http://www.revmatologicka-spolecnost.cz>

tel.: +420 234 07 5244, fax: +420 224 91 4451



ČESKÁ REVMA TOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP